

## Primeras flores de *Borderea chouardii* logradas en maceta

La planta rupícola *Borderea chouardii*, endémica de Sopeira (Huesca) y catalogada "En Peligro Crítico", se había resistido hasta la fecha al cultivo en maceta. Algunas semillas lograban germinar, pero la mayoría de las plántulas morían a los dos meses de edad y las más longevas no pasaban de los seis meses. Pero Jesús Cosculluela ha conseguido mantenerlas durante dos años en el vivero del Gobierno de Aragón en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) e incluso una de ellas ha producido este año dos flores, lo que ha permitido establecer que se trata de un pie masculino. Es la primera vez que *Borderea chouardii* florece en maceta.

La planta se ha cultivado en un sustrato formado por turba sin fertilizar en un 70% y por tierra con materia orgánica compostada, procedente de antiguos desmontes, en el 30% restante. El riego, que no debe ser ni escaso ni excesivo, se ha revelado como un factor clave. Al igual que sucede en la naturaleza, el brote aéreo muere cada año y la planta se mantiene en forma de tubérculo durante el invierno.

### **Dirección de contacto:**

Javier Puente Cabeza · Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca · Gobierno de Aragón ·  
c/ General Lasheras, 8 · 22071 Huesca ·  
Correo electrónico: [jpuente@aragon.es](mailto:jpuente@aragon.es)

Pie masculino de *Borderea chouardii* cultivado en maceta y con dos flores (foto: Jesús Cosculluela).



Xabier Mina · Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC) · c /Accés a la Cala S. Francesc, 14 · 17300 Blanes · Gerona · Correo electrónico: [xmina@ceab.csic.es](mailto:xmina@ceab.csic.es)